

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenci (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okolis (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.1.	AFALON DISPERZIJA	UPI-320- 2008- 01408	Inuron, 450 g/l	Celera na otvorenom prostoru	Jednogišnji širokolistni korovi	1		1,35 l/ha (individualna i masalna kolicina)	min 300 l/ha	12 tjedna prije berbe	Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi ili u popratnom listu. Nije dozvoljena primjena sredstva pomoću letine i ručne prskalice.	15 m	Treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.	Primjeniti poslije sjetve prije nicanja	Preporučuje se testiranje djelovanja sredstva na marjoi površini.
1.1.	AFALON DISPERZIJA	UPI-320- 2008- 01408	Inuron, 450 g/l	Luk (z luboc) na otvorenom prostoru	Jednogišnji širokolistni korovi	1		1,35 l/ha (individualna i masalna kolicina)	min 300 l/ha	8 tjedna prije berbe	Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi ili u popratnom listu. Nije dozvoljena primjena sredstva pomoću letine i ručne prskalice.	15 m	Treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.	Primjeniti poslije sjetve prije nicanja	Preporučuje se testiranje djelovanja sredstva na marjoi površini.
1.1.	AFALON DISPERZIJA	UPI-320- 2008- 01408	Inuron, 450 g/l	Češnjak na otvorenom prostoru	Jednogišnji širokolistni korovi	1		1,35 l/ha (individualna i masalna kolicina)	min 300 l/ha	8 tjedna prije berbe	Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi ili u popratnom listu. Nije dozvoljena primjena sredstva pomoću letine i ručne prskalice.	15 m	Treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.	Primjeniti poslije sjetve prije nicanja	Preporučuje se testiranje djelovanja sredstva na marjoi površini.
1.1.	AFALON DISPERZIJA	UPI-320- 2008- 01408	Inuron, 450 g/l	Luk/Kozjak/Ljuta na otvorenom prostoru	Jednogišnji širokolistni korovi	1		1,35 l/ha (individualna i masalna kolicina)	min 300 l/ha	8 tjedna prije berbe	Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi ili u popratnom listu. Nije dozvoljena primjena sredstva pomoću letine i ručne prskalice.	15 m	Treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.	Primjeniti poslije sjetve prije nicanja	Preporučuje se testiranje djelovanja sredstva na marjoi površini.
1.1.	AFALON DISPERZIJA	UPI-320- 2008- 01408	Inuron, 450 g/l	Pešusolus (vugars grah) i Pešusolus (grah mahures), Pešusolus cocomeus (grah mnogoujetri) na otvorenom prostoru	Jednogišnji širokolistni korovi	1		1,35 l/ha (individualna i masalna kolicina)	min 300 l/ha	16 tjedna prije berbe	Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi ili u popratnom listu. Nije dozvoljena primjena sredstva pomoću letine i ručne prskalice.	15 m	Treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.	Primjeniti poslije sjetve prije nicanja	Preporučuje se testiranje djelovanja sredstva na marjoi površini.
1.1.	AFALON DISPERZIJA	UPI-320- 2008- 01408	Inuron, 450 g/l	Pešusolus (vugars grah) i Pešusolus (grah mahures), Pešusolus cocomeus (grah mnogoujetri) na otvorenom prostoru	Jednogišnji širokolistni korovi	1		0,8 l/ha (individualna i masalna kolicina)	min 200 l/ha	OVP	Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi ili u popratnom listu. Nije dozvoljena primjena sredstva pomoću letine i ručne prskalice.	15 m	Treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.	Primjeniti poslije sjetve prije nicanja	Primjeniti samo na niski grah mahuna koj se bere kao zeleni grah mahunar.
1.1.	AFALON DISPERZIJA	UPI-320- 2008- 01408	Inuron, 450 g/l	Grasak (projejni) za kompostiranje	Jednogišnji širokolistni korovi	1		1,35 l/ha (individualna i masalna kolicina)	min 300 l/ha	OVP	Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi ili u popratnom listu. Nije dozvoljena primjena sredstva pomoću letine i ručne prskalice.	15 m	Treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.	Primjeniti poslije sjetve prije nicanja	Prije primjene na grasaku za kompostiranje obaviti testiranje sajetviti se s pripravcima. Preporučuje se testiranje djelovanja sredstva na marjoi površini.
1.2.	AGIL 100 EC	UPI-320- 2008- 01153	progakazop (100 g/l)	Bob	Jednogišnji uskolisni korovi i samonikle žiince	1		0,8 - 1 l/ha	-	56	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše petnaestput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davat domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC: dt. herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC treba koristiti osobna zaštitna sredstva za od spravljanje bolesti i od visokih rešenja o registraciji zaštitnika.	Primjeniti kad korov razvije tri lista do početka busenja. (Iskreni burgoci, kontaktni herbicidi, sredstva za suzbijanje širokolistnih korova, O mogućnostima primjene sredstva AGIL 100 EC s visokim rešenja o registraciji zaštitnika)	

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uljevi primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja – okolis (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	proprazatop 100 g/l	Bob	Višegodišnji uskolisni korovi Dviji strak ( <i>Sorghum halepense</i> )	1	-	1 - 1,5 l/ha	-	56	S. 363/739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na isto površinsko područje. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC od herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti kada najviše dostigne visinu od 30-40 cm. O mogućnostima kontaktni herbicidi (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi) O mogućnostima mješavina sredstava AGIL 100 EC s drugim sredstvima rasprati se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.	
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	proprazatop 100 g/l	Bob	Višegodišnji uskolisni korovi Prika ( <i>Agrimonia repens</i> )	1	-	1,5-2,0 l/ha	-	56	S. 363/739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na isto površinsko područje. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC od herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti kada bilna dostigne visinu od 15-25 cm. O mogućnostima kontaktni herbicidi (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi) O mogućnostima mješavina sredstava AGIL 100 EC s drugim sredstvima rasprati se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.	
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	proprazatop 100 g/l	Češnjak	Jednogodišnji uskolisni korovi i samonikle žbunice	1	-	1 l/ha	-	56	S. 363/739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na isto površinsko područje. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC od herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti kada korov razvije tri lista do početka busenja. O mogućnostima kontaktni herbicidi (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi) O mogućnostima mješavina sredstava AGIL 100 EC s drugim sredstvima rasprati se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.	
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	proprazatop 100 g/l	Češnjak	Višegodišnji uskolisni korovi Dviji strak ( <i>Sorghum halepense</i> )	1	-	1 l/ha	-	56	S. 363/739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na isto površinsko područje. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC od herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti kada najviše dostigne visinu od 30-40 cm. O mogućnostima kontaktni herbicidi (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi) O mogućnostima mješavina sredstava AGIL 100 EC s drugim sredstvima rasprati se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.	

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa pršenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja – okolni sigurnosni razmak od površinske vode)	Druge ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.2	AGIL 100 EC	UPI-320-2098-01/153	propakvizatop 100 g/l	Češnjak	Višegodišnji uskolisni korovi - Plika (Agropyron repens)	1	-	1,5-2,0 l/ha	-	56	S 363/739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC dr. herbicida za suzbijanje uskolisnih korova treba biti duž od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti kada mješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućnostima mješanja sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima raspršati se kod višenika pršenja o registraciji/zastupnika.	Ne smije se mješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućnostima mješanja sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima raspršati se kod višenika pršenja o registraciji/zastupnika.
1.2	AGIL 100 EC	UPI-320-2098-01/153	propakvizatop 100 g/l	Grah	Jednogodišnji uskolisni korovi - I samonikle žitarice	1	-	1 l/ha	-	28	S 363/739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC dr. herbicida za suzbijanje uskolisnih korova treba biti duž od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti kada korov raste ili mješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućnostima mješanja sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima raspršati se kod višenika pršenja o registraciji/zastupnika.	Ne smije se mješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućnostima mješanja sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima raspršati se kod višenika pršenja o registraciji/zastupnika.
1.2	AGIL 100 EC	UPI-320-2098-01/153	propakvizatop 100 g/l	Grah	Višegodišnji uskolisni korovi - Dviji sirak (Sorghum halepense)	1	-	1 l/ha	-	28	S 363/739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC dr. herbicida za suzbijanje uskolisnih korova treba biti duž od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti kada sirak dostigne visinu od 30-40 cm. O mogućnostima mješanja sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima raspršati se kod višenika pršenja o registraciji/zastupnika.	Ne smije se mješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućnostima mješanja sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima raspršati se kod višenika pršenja o registraciji/zastupnika.
1.2	AGIL 100 EC	UPI-320-2098-01/153	propakvizatop 100 g/l	Grah	Višegodišnji uskolisni korovi - Plika (Agropyron repens)	1	-	1,5-2,0 l/ha	-	28	S 363/739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC dr. herbicida za suzbijanje uskolisnih korova treba biti duž od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti kada mješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućnostima mješanja sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima raspršati se kod višenika pršenja o registraciji/zastupnika.	Ne smije se mješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućnostima mješanja sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima raspršati se kod višenika pršenja o registraciji/zastupnika.

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uljevi primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja – okolis (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	propakizafop 100 g/l	Mkva	Jednopoljni uskolosni korovi i samonikle žitarice	1	-	1 l/ha	-	28	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i/ herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve.	Primjeniti kada korov raste na istoj površini lista do početka busenja.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućostima miješanja sredstava Agil 100 EC s drugim sredstvima raspršiti se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	propakizafop 100 g/l	Mkva	Višegodišnji uskolosni korovi Dviji sjak (Sorghum halepense)	1	-	1 l/ha	-	28	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i/ herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve.	Primjeniti kada sjak dostigne visinu od 30-40 cm.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućostima miješanja sredstava Agil 100 EC s drugim sredstvima raspršiti se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	propakizafop 100 g/l	Mkva	Višegodišnji uskolosni korovi Pirika (Agropyron repens)	1	-	1,5-2,0 l/ha	-	28	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i/ herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve.	Primjeniti kada korov raste na istoj površini lista do početka busenja.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućostima miješanja sredstava Agil 100 EC s drugim sredstvima raspršiti se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	propakizafop 100 g/l	Pastirjak	Jednopoljni uskolosni korovi i samonikle žitarice	1	-	1 l/ha	-	28	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i/ herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve.	Primjeniti kada korov raste na istoj površini lista do početka busenja.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućostima miješanja sredstava Agil 100 EC s drugim sredstvima raspršiti se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rješenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uljevi primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja – okolis (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druge ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.2	AGIL 100 EC	UPI-320-2098-01/153	propakizapop 100 g/l	Pestnjak	Višegodišnji uskolisni korovi - Dviji sirak (Sorghum halepense)	1	-	1 l/ha	-	28	S 363/739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davat domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC dr. herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti kada sirak dostigne visinu od 30-40 cm.  O mogućostima (takveni turgidici, kontaktni herbicidi) miješana sredstva Agil 100 EC s drugim sredstvima rasprati se kod višenika rješenja o registraciji/zastupnika.	
1.2	AGIL 100 EC	UPI-320-2098-01/153	propakizapop 100 g/l	Pestnjak	Višegodišnji uskolisni korovi - Prika (Agropyron repens)	1	-	1,5-2,0 l/ha	-	28	S 363/739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davat domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom Agil 100 EC dr. herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti kada sirak dostigne visinu od 15-25 cm.  O mogućostima (takveni turgidici, kontaktni herbicidi) miješana sredstva Agil 100 EC s drugim sredstvima rasprati se kod višenika rješenja o registraciji/zastupnika.	
1.2	AGIL 100 EC	UPI-320-2098-01/153	propakizapop 100 g/l	Peršin	Jednogodišnji uskolisni korovi i samonikle žbunice	1	-	1 l/ha	-	21	S 363/739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davat domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom Agil 100 EC dr. herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti kada korov raste u tri lista do početka busenja.  O mogućostima (takveni turgidici, kontaktni herbicidi) miješana sredstva Agil 100 EC s drugim sredstvima rasprati se kod višenika rješenja o registraciji/zastupnika.	
1.2	AGIL 100 EC	UPI-320-2098-01/153	propakizapop 100 g/l	Peršin	Višegodišnji uskolisni korovi - Dviji sirak (Sorghum halepense)	1	-	1 l/ha	-	21	S 363/739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davat domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom Agil 100 EC dr. herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti kada sirak dostigne visinu od 30-40 cm.  O mogućostima (takveni turgidici, kontaktni herbicidi) miješana sredstva Agil 100 EC s drugim sredstvima rasprati se kod višenika rješenja o registraciji/zastupnika.	



Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja – okolis (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druge ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.2.	AGIL 100 EC	UPI/320-2098-01/153	propakizafop 100 g/l	Rabarbara	Jednogodišnji uskolisni korovi i samonikle žitarice	1	-	1 l/ha	-	OVP	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duž od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti nakon berbe rabarbara, kada korov nazivje ili lista do početka busenja. O mogućnostima mješavina sredstava AGIL 100 EC s drugim sredstvima respirirati se kod višenika rešenja o registraciji/zastupnika.	Ne smije se mješati sa kontinirnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućnostima mješavina sredstava AGIL 100 EC s drugim sredstvima respirirati se kod višenika rešenja o registraciji/zastupnika.
1.2.	AGIL 100 EC	UPI/320-2098-01/153	propakizafop 100 g/l	Rabarbara	Višegodišnji uskolisni korovi Dviji sijek (Syringium helopense)	1	-	1 l/ha	-	OVP	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duž od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti nakon berbe rabarbare, kada pinke dostignu visinu od 30-40 cm. O mogućnostima mješavina sredstava AGIL 100 EC s drugim sredstvima respirirati se kod višenika rešenja o registraciji/zastupnika.	Ne smije se mješati sa kontinirnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućnostima mješavina sredstava AGIL 100 EC s drugim sredstvima respirirati se kod višenika rešenja o registraciji/zastupnika.
1.2.	AGIL 100 EC	UPI/320-2098-01/153	propakizafop 100 g/l	Rabarbara	Višegodišnji uskolisni korovi Prika (Agropyron repens)	1	-	1,5-2,0 l/ha	-	OVP	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duž od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti nakon berbe rabarbare, kada pinke dostignu visinu od 15-20 cm. O mogućnostima mješavina sredstava AGIL 100 EC s drugim sredstvima respirirati se kod višenika rešenja o registraciji/zastupnika.	Ne smije se mješati sa kontinirnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućnostima mješavina sredstava AGIL 100 EC s drugim sredstvima respirirati se kod višenika rešenja o registraciji/zastupnika.
1.2.	AGIL 100 EC	UPI/320-2098-01/153	propakizafop 100 g/l	Spargola	Jednogodišnji uskolisni korovi i samonikle žitarice	1	-	1 l/ha	-	OVP	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duž od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti nakon berbe šparogole, kada korov nazivje ili lista do početka busenja. O mogućnostima mješavina sredstava AGIL 100 EC s drugim sredstvima respirirati se kod višenika rešenja o registraciji/zastupnika.	Ne smije se mješati sa kontinirnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućnostima mješavina sredstava AGIL 100 EC s drugim sredstvima respirirati se kod višenika rešenja o registraciji/zastupnika.

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uljevi primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okolis (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	propraktazop 100 g/l	Šparoga	Višegodišnji uskolisni korovi Dviji strak (Sorghum halepense)	1	-	1 l/ha	-	OVP	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše petnaestputi godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i/đ. herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zarašćenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti korov razvije tri lista do početka busenja. 30-40 cm.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (takveni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućnostima mješavina sredstava Agil 100 EC s drugim sredstvima raspiati se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	propraktazop 100 g/l	Šparoga	Višegodišnji uskolisni korovi Prljica (Agropyron repens)	1	-	1,5-2,0 l/ha	-	OVP	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše petnaestputi godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom Agil 100 EC i/đ. herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zarašćenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti korov razvije tri lista do početka busenja. 15-25 cm.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (takveni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućnostima mješavina sredstava Agil 100 EC s drugim sredstvima raspiati se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	propraktazop 100 g/l	Špinat	Jednogodišnji uskolisni korovi i samonikle žbance	1	-	1 l/ha	-	Z1	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše petnaestputi godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom Agil 100 EC i/đ. herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zarašćenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti korov razvije tri lista do početka busenja. 30-40 cm.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (takveni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućnostima mješavina sredstava Agil 100 EC s drugim sredstvima raspiati se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	propraktazop 100 g/l	Špinat	Višegodišnji uskolisni korovi Dviji strak (Sorghum halepense)	1	-	1 l/ha	-	Z1	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše petnaestputi godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom Agil 100 EC i/đ. herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zarašćenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve.	Primjeniti korov razvije tri lista do početka busenja. 30-40 cm.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (takveni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućnostima mješavina sredstava Agil 100 EC s drugim sredstvima raspiati se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.



Redni broj	Naziv sredstva	Klasa pršenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili vrste primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja – okolis (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druge ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.2.	AGIL 100 EC	UP1-320-2098-01/153	propakvizatop 100 g/l	Špinat	Višegodišnji uskolisni korovi - Plika (Agropyron repens)	1	-	1,5-2,0 l/ha	-	21	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i: herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisane usjeve.	Primjeniti kada mješati sa sadržajima u visini od 15-25 cm.	Ne smije se mješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi) O mogućostima mješanja sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima rasprati se kod višenika pršenja o registraciji/zastupnika.
1.2.	AGIL 100 EC	UP1-320-2098-01/153	propakvizatop 100 g/l	Kupina	Jednogodišnji uskolisni korovi - Isomonike - Zlanice	1	-	1 l/ha	-	OVP	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i: herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisane usjeve.	Primjeniti kada korov raste u mješati sa sadržajima u visini od 30-40 cm.	Ne smije se mješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi) O mogućostima mješanja sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima rasprati se kod višenika pršenja o registraciji/zastupnika.
1.2.	AGIL 100 EC	UP1-320-2098-01/153	propakvizatop 100 g/l	Kupina	Višegodišnji uskolisni korovi - Dviji sirak (Sorghum halepense)	1	-	1 l/ha	-	OVP	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i: herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisane usjeve.	Primjeniti kada sirak dostigne visinu od 30-40 cm.	Ne smije se mješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi) O mogućostima mješanja sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima rasprati se kod višenika pršenja o registraciji/zastupnika.
1.2.	AGIL 100 EC	UP1-320-2098-01/153	propakvizatop 100 g/l	Kupina	Višegodišnji uskolisni korovi - Plika (Agropyron repens)	1	-	1,5-2,0 l/ha	-	OVP	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i: herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC spriječiti zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolisane usjeve.	Primjeniti kada mješati sa sadržajima u visini od 15-25 cm.	Ne smije se mješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi) O mogućostima mješanja sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima rasprati se kod višenika pršenja o registraciji/zastupnika.

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uljevi primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja – okolni sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	proprazatop 100 g/l	Melina	Jednogodišnji uskolosni korovi isamonke žrnica	1	-	1 l/ha	-	OVP	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i/đ. herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve.	Primjeniti kada korov raste na listu do početka bušenja.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućostima mješavina sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima raspijati se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	proprazatop 100 g/l	Melina	Višegodišnji uskolosni korovi Dviji sjak (Syrphium holopense)	1	-	1 l/ha	-	OVP	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i/đ. herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve.	Primjeniti kada sjak dostigne visinu od 30-40 cm.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućostima mješavina sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima raspijati se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	proprazatop 100 g/l	Melina	Višegodišnji uskolosni korovi Prika (Agropyron repens)	1	-	1,5-2,0 l/ha	-	OVP	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i/đ. herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve.	Primjeniti kada sjak dostigne visinu od 15-25 cm.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućostima mješavina sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima raspijati se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.
1.2.	AGIL 100 EC	UPA-320-2098-01/153	proprazatop 100 g/l	Rbz	Jednogodišnji uskolosni korovi isamonke žrnica	1	-	1 l/ha	-	OVP	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i/đ. herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti duži od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zanošenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve.	Primjeniti kada korov raste na listu do početka bušenja.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). O mogućostima mješavina sredstva AGIL 100 EC s drugim sredstvima raspijati se kod vlasnika rešenja o registraciji/zastupnika.

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa pršenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja (ili cvjet) primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenjiva	Ograničenja - okoliš (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Viljene primjene	Napomena
1.2.	AGIL 100 EC	UP1-320-2098-01/153	propakizafop 100 g/l	Rbuz	Višegodišnji uskolosni korovi Dviji sarak (Sorghum halepense)	1	-	1 l/ha	-	OVP	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i dr. herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti od 3 do 30 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zarašćenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve.	Primjeniti kada sarak dostigne visinu od 30-40 cm.  O mogućnostima primjena sredstva AGIL 100 EC s pršenjem na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve, raspiрати se kod vlasnika pršenja o registraciji/zastupnika.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi).
1.2.	AGIL 100 EC	UP1-320-2098-01/153	propakizafop 100 g/l	Rbuz	Višegodišnji uskolosni korovi Prika (Agropyron repens)	1	-	1,5-2,0 l/ha	-	OVP	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i dr. herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti od 3 do 30 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zarašćenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve.	Primjeniti kada prika dostigne visinu od 15-25 cm.  O mogućnostima primjena sredstva AGIL 100 EC s pršenjem na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve, raspiрати se kod vlasnika pršenja o registraciji/zastupnika.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi).
1.2.	AGIL 100 EC	UP1-320-2098-01/153	propakizafop 100 g/l	Ukrasno bilje širokolistno	Višegodišnji uskolosni korovi Isamonike žrnice	1	-	1 l/ha	-	nije primjenjivo	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i dr. herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti od 3 do 30 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zarašćenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve.	Primjeniti kada korov ravnice ili lista do pođe klice busnjača.  O mogućnostima primjena sredstva AGIL 100 EC s pršenjem na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve, raspiрати se kod vlasnika pršenja o registraciji/zastupnika.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi).
1.2.	AGIL 100 EC	UP1-320-2098-01/153	propakizafop 100 g/l	Ukrasno bilje širokolistno	Višegodišnji uskolosni korovi Dviji sarak (Sorghum halepense)	1	-	1 l/ha	-	nije primjenjivo	S 363739 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice	20 m	A) Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGIL 100 EC i dr. herbicida za suzbijanje širokolistnih korova treba biti od 3 do 30 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGIL 100 EC sprječati zarašćenje škropliva na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve.	Primjeniti kada sarak dostigne visinu od 30-40 cm.  O mogućnostima primjena sredstva AGIL 100 EC s pršenjem na susjedne kulture, posebno na uskolosne usjeve, raspiрати se kod vlasnika pršenja o registraciji/zastupnika.	Ne smije se miješati sa kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi).

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rješenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okolis (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.2.	AGLI 100 EC	UPI-320-2098-01153	provalazop 100 g/l	Ukrsne bilje širokolisno	Višegodišnji širokolisni korovi Prika ( <i>Agropyron repens</i> )	1	1,5-2,0 l/ha	-	nije primjenjivo	S 563739 Zaštićena površina, odbojci, odbojci i zaštitna sredstva za očišća	20 m	A) Sredstvo AGLI 100 EC smije se koristiti najviše pet puta godišnje na svoj površini B) Korove tretirane sredstvom AGLI 100 EC ne darati domaćim životinjama. C) Razmak između tretiranja sredstvom AGLI 100 EC (tj. herbicida) za susjedne širokolisni korova treba biti duže od 3 dana. D) Prilikom primjene sredstva AGLI 100 EC slijedi zabranjena skopca na susjedne kulture, posebno na usosane usjeve.	Primeniti kada su visine od 15-25 sredstvom (takveni lupčadi, kontakni herbicidi) O mogućostima mješavina sredstava Agli 100 EC s drugim sredstvima raspišati se kod vlastitka rješenja o registraciji/zastupnika.	
1.3.	GOLTIX WG 70	UPI-320-2098-01120	metamiton, 700 g/kg	Prasjak na otvorenom prostoru	jednogodišnji širokolisni korovi	1	3 kg/ha (pojedinačna količina)	min 200 l	0VP	Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi ili u popratnom listu.	20 m	Ovaj proizvod se mora primijeniti u skladu s uvjetima ovog odobrenja, etiketi sredstva i/ili popratnog lista. U slučaju propredavanja ili propadanja usjeva, zeleni dijelovi biljke ne smije puštati stoku na tretirane površine.	Prije nicanja tretiranje sredstva na manjoj površini.	
1.3.	GOLTIX WG 70	UPI-320-2098-01120	metamiton, 700g/kg	Herba na otvorenom prostoru	jednogodišnji širokolisni korovi	1	3 kg/ha (pojedinačna količina)	min 200 l	0VP	Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi ili u popratnom listu.	20 m	Ovaj proizvod se mora primijeniti u skladu s uvjetima ovog odobrenja, etiketi sredstva i/ili popratnog lista. U slučaju propredavanja ili propadanja usjeva, zeleni dijelovi biljke ne smiju se davati stoci za hranu niti se ne smije puštati stoku na tretirane površine.	Preporučuje se tretiranje sredstva na manjoj površini.	
1.3.	GOLTIX WG 70	UPI-320-2098-01120	metamiton, 700g/kg	Artičoka na otvorenom prostoru	jednogodišnji širokolisni korovi	1	5 kg/ha (pojedinačna količina) 10 kg/ha (naprava/količina/kulturni)	min 200 l	28 dana prije berbe	Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi ili u popratnom listu.	20 m	Ovaj proizvod se mora primijeniti u skladu s uvjetima ovog odobrenja, etiketi sredstva i/ili popratnog lista. U slučaju propredavanja ili propadanja usjeva, zeleni dijelovi biljke ne smiju se davati stoci za hranu niti se ne smije puštati stoku na tretirane površine.	Primeniti sa hidroalucinim uređajima za prskanje lista. Preporučuje se tretiranje sredstva na manjoj površini.	
1.3.	GOLTIX WG 70	UPI-320-2098-01120	metamiton, 700g/kg	Čeler (lišbo) na otvorenom prostoru	jednogodišnji širokolisni korovi	1	5 kg/ha (pojedinačna količina) 10 kg/ha (naprava/količina/kulturni)	min 200 l	28 dana prije berbe	Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi ili u popratnom listu.	20 m	Ovaj proizvod se mora primijeniti u skladu s uvjetima ovog odobrenja, etiketi sredstva i/ili popratnog lista. U slučaju propredavanja ili propadanja usjeva, zeleni dijelovi biljke ne smiju se davati stoci za hranu niti se ne smije puštati stoku na tretirane površine.	Primeniti sa hidroalucinim uređajima za prskanje lista. Preporučuje se tretiranje sredstva na manjoj površini.	
1.3.	GOLTIX WG 70	UPI-320-2098-01120	metamiton, 700g/kg	Rabarbara na otvorenom prostoru	jednogodišnji širokolisni korovi	1	5 kg/ha (pojedinačna količina) 10 kg/ha (naprava/količina/kulturni)	min 200 l	28 dana prije berbe	Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi ili u popratnom listu.	20 m	Ovaj proizvod se mora primijeniti u skladu s uvjetima ovog odobrenja, etiketi sredstva i/ili popratnog lista. U slučaju propredavanja ili propadanja usjeva, zeleni dijelovi biljke ne smiju se davati stoci za hranu niti se ne smije puštati stoku na tretirane površine.	Primeniti sa hidroalucinim uređajima za prskanje lista. Preporučuje se tretiranje sredstva na manjoj površini.	

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rješenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karencna (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okoliš (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.4.	LINUREX 50 SC	UP1-320-2008-01411	linuron 500 g/l	Celuloz (osim drvećem)	jednopolni širokolisni korovi	1	-	1,2 t/ha	min.300	84	SPo. Obavljeno je neštanje zaštitnih ulazaka kod primjene škroplja, kod rukovanja nerazrijeđenim sredstvom i dodiru s površinama koje su onečišćene nerazrijeđenim sredstvom ili škropljivom. SPo. Nije dozvoljena primjena pomoću letice i ručne prskalice. SPo. 2. Nakon uporabe sredstva ograti zaštitnu odjeću.	Mera zaštite okoliša. Kod primjene sredstva LINUREX 50 SC moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo LINUREX 50 SC ne smije se primjenjivati u svakim područjima te lagunim pjeskovitim, šalesitim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispranja u površinske vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite okoliša i neškodljivosti organizama koje šteti, mora se poštovati razmak od površinske vode - mjesto od ruha opake, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 15 metara. Ne tretirati po vegetativnom vremenu. Ostaci sredstva i škroplja ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, čvorčare i stajiske odvođa. Prskalicu i miazritce (dže) treba prati ne polju, na mjestima gdje sredstvo ne može dospjeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ptice i životinje. SPo.3. Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati razmak od 15 m do vode površine. SPo. 4. Zbog zaštite nosača polja i neškodljivosti organizama treba poštivati zone sigurnosti od 10 m do nepoželjivih površina.	Ne primjenjivati sredstvo LINUREX 50 SC kada je jako vruće. SPi. Spremati onečišćenje voda sredstvom ili prskalicom. Sredstva ne ostavljati u otvorenoj posudi. SPi. Spremati onečišćenje okolnih tvari s podzemnim vodama. SPi. 1. Zbog sprječavanja opasne otpornosti (rezistencije) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži linuron više od jedan put, godišnje na istoj površini.	Sredstvo se primjenjuje ručno sa špihla, a nakon nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em) čim korovi niču.	Nije dozvoljena primjena pomoću letice i ručne prskalice. Preporučuje se djelovanje sredstva na maripji površini.

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okolisi (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.4.	LINUREX 50 SC	UP1-320-2006-01411	flurofop 500 g/l	Luk i izlučak (na otvorenim)	jednogodišnji širokolisni korovi	1	-	1,2 t/ha	min.300	56	<p>SPo. Obavezno je odložiti primjene skropiva, kod rukovanja sa herbicidnim sredstvima i u dobru s površinama koje su onečišćene nerazgrađenim sredstvima ili skropivom.</p> <p>SPo. Nije dozvoljena primjena pomoću letlice i ručne prskalice.</p> <p>SPo. 2. Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću</p>	<p>Ne primjenjivati sredstvo LINUREX 50 SC na površinama koje se ne razmnožavaju. Ne smije se primjenjivati na lakim tlima s manje od 1,5 % humusa, a tlima s više od 5 % humusa.</p> <p>SP1. Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovim amalakom. Uredbe za primjenu sredstva ne čita u blizini površinskih voda.</p> <p>Sprječiti onečišćenje otvornih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i ostia.</p> <p>SPa1. Zbog sprječavanja pojave otpornosti (resistencije) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži linuron više od jedan put godišnje na istoj površini.</p>	<p>Primjenjuje se na otvorenoj površini (p.e.m).</p>	<p>Nije dozvoljena primjena u blizini otvorenih površina. Preporučuje se testiranje djelotvornosti sredstva na manjoj površini.</p>	

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rješenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okoliš (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.4.	LINUREX 50 SC	UP1-320-2008-01411	linuron 500 g/l	Četnik (na otvorenom)	jedročlani širokolistni korovi	1	-	1,2 l/ha	min.300	56	SP: Obavljeno je neštene zaštita ulećava kod primjene skroplja, kod rukovanja nerazrijeđenim sredstvom i dodiru s površinama koje su onečišćene nerazrijeđenim sredstvom ili skropljom. SPc: Nije dozvoljena primjena pomoću letine i ručne prskalice. SPo, 2: Nakon uporabe sredstva ograti zaštitnu odjeću.	Mjera zaštite okoliša: Kod primjene sredstva LINUREX 50 SC moraju se poštovati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo LINUREX 50 SC ne smije se primjenjivati u svakim područjima, te laganim preskopljom, skeletirni svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik isparanja u pozadnje vode. Ako drugim sigurnosni razmak, radi zaštite okoliša i neškodljivosti organizama koje su u kontaktu s mešom od ručne opake, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 15 metara. Ne tretirati po vegetativnom vremenu. Ostaci sredstva i skroplja ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, čvorčare i stajiske odvođe. Prskalicu i miazritce (dže) treba prati ne polju, na mjestima gdje sredstvo ne može dospjeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ptice i životinje. SP-B: Zbog zaštite vodenih organizama treba postupati oprezno i ne koristiti više od 15 m do udaljene površine.	Ne primjenjivati sredstvo LINUREX 50 SC kod ili ako vrata. Sredstvo se ne smije koristiti na kulturama koje se razmnožavaju. Ne smije se primjenjivati na lakim tlima s manje od 1,5 % humusa i na tlima s više od 5 % humusa. SP1: Sprejčiti onečišćene vode sredstvom ili njegovom amalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejčiti onečišćene otvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i oesla. SPa1: Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistencije) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži linuron više od jedan put godišnje na istoj površini.	Primjenjuje se poslije obilne kiše, u vrijeme nicanja (pre-em).	Nije dozvoljena primjena pomoću ručne prskalice. Preporučuje se djelovanje sredstva na marnjo površini.

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rješenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okoliš (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.4.	LINUREX 50 SC	UP1-320-2008-01411	flurofuron 500 g/l	1,4-kogpak (na otvorenom)	jedročlani širokolistni korovi	1	-	1,2 t/ha	min.300	56	SPo: Obavljeno je neštanje zasitnih uljica od primjene skropnja, kod rukovanja nerazrijeđenim sredstvom i dodiru s površinama koje su onečišćene nerazrijeđenim sredstvom ili skropivom. SPo: Nije dozvoljena primjena pomoću letice i ručne psikalice. SPo, 2: Nakon uporabe sredstva ograti zaštitnu odjeću.	Mjera zaštite okoliša: Kod primjene sredstva LINUREX 50 SC moraju se poštovati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo LINUREX 50 SC ne smije se primjenjivati u svakim područjima te laganim tokovima, skeletirni svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispranja u podzemne vode. Ako drugim sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i nekorisnih organizama koji su osjetljivi na razmak od ručne opake, koji za dopušteno primjene iznosi najmanje 15 metara. Ne tretirati po vijetovitim vremenima. Ostaci sredstva i skropnja ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, čvorčare i stajiske odvođa. Psikalicu i miazritice (dže) treba prati ne polju, na mjestima gdje sredstvo ne može dospjeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ptice i životinje. SPo:3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštovati razmak od 15 m do vode površine. SPo, 4: Zbog zaštite neštanjilja nekorisnih životinja treba poštovati zone sigurnosti od 10 m do nepoželjivne površine.	Ne primjenjivati sredstvo LINUREX 50 SC kod ili ako vrata. Sredstvo se ne smije koristiti na kulturama koje su razmnožavaju. Ne smije se primjenjivati na lakim tlima s manje od 1,5 % humusa i na tlima s više od 5 % humusa. SP1: Sprejčiti onečišćene vode sredstvom ili njegovom amalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejčiti onečišćene otvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i oesela. SPa1: Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistencije) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži linuron više od jedan put godišnje na istoj površini.	Primjenjuje se poslije obilne kiše, na površini koja nije nacija (pre-em).	Nije dozvoljena primjena pomoću letice i ručne psikalice. Preporučuje se djelovanje sredstva na marioj površini.



Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okoliš (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.4.	LINUREX 50 SC	UP1-320-2008-01411	flurofop 500 g/l	Povlak (na oboravom)	jedročlani širokolistni korovi	1	-	1,2 t/ha	min.300	112	SPc. Obavljeno je neštene zaštita ulećava kod primjene skropica, kod rukovanja nerazrijeđenim sredstvom i dodiru s površinama koje su onečišćene nerazrijeđenim sredstvom ili skropicom. SPc. Nije dozvoljena primjena pomoću letine i ručne prskalice. SPc. 2. Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.	Mera zaštite okoliša. Kod primjene sredstva LINUREX 50 SC moraju se poštovati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo LINUREX 50 SC ne smije se primjenjivati u svakim područjima, osim u svim preskopljivim, skeletirani svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispranja u podzemne vode. Ako drugim sigurnosni razmak, radi zaštite okoliša i neškodljiv organizama pri primjeni sredstva, razmak od površinske vode, mjesto od ručne opake, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 15 metara. Ne tretirati po vegetativnom vremenu. Ostaci sredstva i skropica ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, čvorčare i stajiske odvođe. Prskalicu i miazritce (dže) treba prati ne polju, na mjestima gdje sredstvo ne može dospjeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ptice i životinje. SP-B. Zbog zaštite vodenih organizama treba poštovati razmak od 15 m do vodenih površina. SP-c. Zbog zaštite neškodljivih i neželjenih članova faune treba poštovati zone sigurnosti od 10 m do nepoljoprivredne površine.	Ne primjenjivati sredstvo LINUREX 50 SC kod ili ako vrata. Sredstvo se ne smije koristiti na kulturama koje se razmnožavaju. Ne smije se primjenjivati na lakim tlima s manje od 1,5 % humusa i na tlima s više od 5 % humusa. SP1. Sprejčiti onečišćene vode sredstvom ili njegovom amalakom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejčiti onečišćene vodotokne kanale s poljoprivrednih gospodarstava i cestia. SPa1. Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistencije) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži linuron više od jedan put godišnje na istoj površini.	Primjenjuje se poslije obilne padavine i ručne primjene (pre-em).	Nije dozvoljena primjena pomoću letine i ručne prskalice. Preporučuje se djelovanje sredstva na marioj površini.

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (l/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okolis (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.4.	LINUREX 50 SC	UPI-320-2006-01411	flurofop-p 500 g/l	Grah (na otvorenim)	jednopolni širokolisni korovi	1	-	0,75 l/ha	min:200	OVP	SPo Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca i rukovanje nerazrijeđenim sredstvom u dodiru s površinama koje su onečišćene nerazrijeđenim sredstvom ili škropovom. SPo: Nije dozvoljena primjena pomoću letine i ručne prskalice. SPo 2. Nakon uorotabe sredstva oporiti zaštitnu odjeću	Me primjenjivati sredstvo LINUREX 50 SC, prskanje se ne smije vršiti na kuluama koja se razmazuju. Ne smije se primjenjivati na lakom tlima s manje od 1,5 % humusa i tlima s više od 5 % humusa. SP1 Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom amalakom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje otvornih kanala s poljoprivrednih gospodarstava tasala. SPa1. Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži linuron više od jedan put godišnje na istoj površini.	Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja usjeva i korova (post-em).	Nije dozvoljeno primjenjivati sredstvo u blizini površinske vode. Preporučuje se testiranje djelovanja sredstva na marjpi površini.	
1.4.	LEOPARD 5 EC	UPI-320-2006-01196	kizalofop-p 50 g/l	Tikvenjace (Cucurbitaceae)	jednopolni uskolisni korovi	1	-	1-2,5 l/ha	200-400	21	SPo Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca i rukovanje kod primjene škropiva i rukovanje nerazrijeđenim sredstvom. SPo Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca u dodiru s površinama onečišćenim nerazrijeđenim sredstvom ili škropovom. SPo Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca i rukovanje kod primjene škropiva i rukovanje nerazrijeđenim sredstvom. SPo Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca u dodiru s površinama onečišćenim nerazrijeđenim sredstvom ili škropovom.	<b>Piodor:</b> 3 mjeseca nakon primjene sredstva smiju se sijati žitarice.	Primjeniti nakon nicanja usjeva i korova (post-em).		
1.4.	LEOPARD 5 EC	UPI-320-2006-01196	kizalofop-p 50 g/l	Tikvenjace (Cucurbitaceae)	Višegodišnji uskolisni korovi	1	-	2-4 l/ha	200-400	21	SPo Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca i rukovanje kod primjene škropiva i rukovanje nerazrijeđenim sredstvom. SPo Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca u dodiru s površinama onečišćenim nerazrijeđenim sredstvom ili škropovom.	<b>Piodor:</b> 3 mjeseca nakon primjene sredstva smiju se sijati žitarice.	Primjeniti nakon nicanja usjeva i korova (post-em).		

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rješenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja i/ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (l/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja – okolni sigurnosni razmak od površinske vode	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
1.5.	MISTRAL 70 WG	UPI-320-2006-01/274	metilbuzin, 700g/kg	Mikava na otvorenom prostoru	jednogođišnji širokolisni korovi – uključujući žutu rezadu (Reseda lutea) i divji pesčin (Aethusa cynapium)	2	21	1 kg/ha (najveća pojedinačna količina) 2 kg/ha (najveća ukupna količina/kultur)	min 200 l/ha	28	SP: Obavezno je rošjenje pastirne odleke i zaštićenih rukovanja nezajednim sredstvima.	20 m	Ovaj proizvod se mora primijeniti u skladu s uvjetima ovog odobrenja, efikaci sredstva i/ili popravnog lista.	Prije nicanja	Preporučuje se testiranje sredstva na majnoj površini. Primjeri je s konvencionalnim hidrauličkim prskalicama uključujući prskalice sa zračnom potiskom ručne.
1.5.	MISTRAL 70 WG	UPI-320-2006-01/274	metilbuzin, 700g/kg	Pastirak na otvorenom prostoru	jednogođišnji širokolisni korovi	2	21	1 kg/ha (najveća pojedinačna količina) 2 kg/ha (najveća ukupna količina/kultur)	min 200 l/ha	28	Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi ili u popravnog listu.	20 m	Ovaj proizvod se mora primijeniti u skladu s uvjetima ovog odobrenja, efikaci sredstva i/ili popravnog lista.	Prije nicanja	Postoji mogućnost fitotoksičnosti djelovanja, kada se koristi jak tlaz u prskalicama. Preporučuje se testiranje sredstva na majnoj površini. Primjeri je s konvencionalnim hidrauličkim prskalicama uključujući prskalice sa zračnom potiskom ručne.
1.5.	MISTRAL 70 WG	UPI-320-2006-01/274	metilbuzin, 700g/kg	Šparoga na otvorenom prostoru	jednogođišnji širokolisni korovi	1		1,25 kg/ha/gojnu	min 200 l/ha	OVF	SP: Obavezno je rošjenje zaštićene odleke i zaštićenih rukovanja, kod pripreme skopnih sredstvom.	20 m	Ovaj proizvod se mora primijeniti u skladu s uvjetima ovog odobrenja, efikaci sredstva i/ili popravnog lista.	Dok je kultura u cvatnji (uključujući godni berba).	Preporučuje se testiranje sredstva na majnoj površini. Primjeri je s konvencionalnim hidrauličkim prskalicama uključujući prskalice sa zračnom potiskom ručne.
2.1.	MERPAN 80 WDG	UPI-320-2003-01/82	kapitan 800g/kg	Dunja	Prave cvijeta i lista (Mortinia luteipes/rosea) Tuzel, ploda (Mortinia mozgana)	5	10	2 kg/ha, odnosno 0,2 % /200 g na 100 l vode)	500-1500	21	SP: Obavezno je rošjenje zaštićene odleke, rukavica, štrikna za lice ili naočala koje dobro priprajuju i filtere polumaski ili maske za zaštitu od čestica s filterom F3 kod pripreme skopnih rukovanja nezajednim sredstvima.	20 m do vodene površine.	SP1. Sprejčiti onečišćenje voda sredstvima ili njegovom ambalazom. Uredjaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejčiti onečišćenje odobrenih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i ceta.	Primjeniti preventivno ili pri pojavu prvih znakova bolesti.	Ne smije se miješati s kemikalijama insekticidima, drugim sredstvima, kalij posušnicima i bakterijama fungicidima.

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja i/ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okolis (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
2.1.	MERRAN 80 WDG	UPI-320-2003-0182	kaplan 800g/kg	Maričica	Suprakvosti lišća (Stigmija carpophila)	3	-	0,125-0,2%	1000-1500	21	SpO. Obavezno je nošenje zaštitne odjeće i rukavica koje dobro prijanja i maske za zaštitu od čestica s filterom P3 kod pripreme škropiva i rukovanja koncentriranim sredstvom. SpO. Obavezno je nošenje zaštitne odjeće kod primjene sredstva i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom. SpO. Obavezno je nošenje zaštitne odjeće i rukavica u dodiru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	SpI. Sprečiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalazom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejati onečišćenje okolnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.	Primjeniti preventivno ili pri početku znakova bolesti.	Ne smije se miješati s kiselim sredstvom, ne miješati s kiselim sredstvom, ne miješati s kiselim sredstvom i bakrenim fungicidima.
2.1.	MERRAN 80 WDG	UPI-320-2003-0182	kaplan 800g/kg	Višnja	Suprakvosti lišća (Stigmija carpophila)	2	-	0,125-0,2%	1000-1500	21	SpO. Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, rukavica, štitnika za lice i naočala koje dobro prijanja i maske za zaštitu od čestica s filterom P3 kod pripreme škropiva i rukovanja koncentriranim sredstvom. SpO. Obavezno je nošenje zaštitne odjeće kod primjene sredstva i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom. SpO. Obavezno je nošenje zaštitne odjeće i rukavica u dodiru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	SpI. Sprečiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalazom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejati onečišćenje okolnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.	Primjeniti preventivno ili pri početku znakova bolesti.	Ne smije se miješati s kiselim sredstvom, ne miješati s kiselim sredstvom, ne miješati s kiselim sredstvom i bakrenim fungicidima.
2.2.	NINROD 25 EC	UPI-320-2003-01256	bupirimat 250 g/l	Bundeva	Površnica (Erysiphe brassicae, Sphaerotheca mors-uvae)	6	7	0,04-0,05% (40-50 ml/h)	-	7	SpO. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica štitnika za lice i naočala koje dobro prijanja kod pripreme škropiva i rukovanja koncentriranim sredstvom.	20 m do vodene površine.	Ne preporučuje se miješati s fungicidima iz skupine difenilamata (mancozeb, propineb, metiram), bakrenim fungicidima, fosfolim, pirakvokarbom, svim lužnatim sredstvima i dodacima. Ne smiju se dodavati okvašivači. SpI. Sprejati onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalazom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejati onečišćenje okolnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.	Primjeniti preventivno ili pri početku znakova bolesti.	Ne tretirati otvoren cvijet. Ne koristiti kod blijaka oslabljenih uslijed suše. Sredstvo je štetno za populacije Enchytasidna formosa i Typhlodromus pyri.
2.2.	NINROD 25 EC	UPI-320-2003-01256	bupirimat 250 g/l	Crni ribiz (na obojorom)	Površnica (Erysiphe brassicae, Sphaerotheca mors-uvae)	-	7	1,0 l/ha	min. 300 l	7	SpO. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica štitnika za lice i naočala koje dobro prijanja kod pripreme škropiva i rukovanja koncentriranim sredstvom.	20 m do vodene površine.	Ne preporučuje se miješati s fungicidima iz skupine difenilamata (mancozeb, propineb, metiram), bakrenim fungicidima, fosfolim, pirakvokarbom, svim lužnatim sredstvima i dodacima. Ne smiju se dodavati okvašivači. SpI. Sprejati onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalazom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejati onečišćenje okolnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.	Primjeniti preventivno ili pri početku znakova bolesti.	Ne tretirati otvoren cvijet. Ne koristiti kod blijaka oslabljenih uslijed suše. Sredstvo je štetno za populacije Enchytasidna formosa i Typhlodromus pyri.

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja i/ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okolis (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
2.2.	NINROD 25 EC	UPI-320-2003-01/256	buipirmat 250 g/l	Crni ribiz (na otvorenom)	Pepehica (Microspilara grassei) i/ili Sphaerotheca mors-uae	-	14	2,0 l/ha	min. 300 l	7	Spz Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica i štrikva za lice ili nosača koje dobro prijanjaju kod pripreme škropiva i rukovanje koncentratnim sredstvom.	20 m do vodene površine.	Ne preporučuje se mješati s fungicidima iz skupine diklobenilamata (markozab, propineb, metiram), baktericim fungicidima (fosetilm, progamokarbom, svim lužalnim sredstvima i/odionim. Ne smiju se dodavati okvašivači. SP1 Sprejati onečišćenje voda sredstvom ili njegovom amulažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejati onečišćenje odvodnih kanala s podrprivećih gospodarstava i/cesta.	Primjeniti preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolesti. Sredstvo je štetno za populacije Erichasia formosai i Tiphodromus pyri.	
2.2.	NINROD 25 EC	UPI-320-2003-01/256	buipirmat 250 g/l	Malina (na otvorenom)	Pepehica (Phodospilarea aphans)	-	10	1,1 l/ha	-	8	Spz Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica i štrikva za lice ili nosača koje dobro prijanjaju kod pripreme škropiva i rukovanje koncentratnim sredstvom.	20 m do vodene površine.	Ne preporučuje se mješati s fungicidima iz skupine diklobenilamata (markozab, propineb, metiram), baktericim fungicidima (fosetilm, progamokarbom, svim lužalnim sredstvima i/odionim. Ne smiju se dodavati okvašivači. SP1 Sprejati onečišćenje voda sredstvom ili njegovom amulažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejati onečišćenje odvodnih kanala s podrprivećih gospodarstava i/cesta.	Primjeniti preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolesti. Sredstvo je štetno za populacije Erichasia formosai i Tiphodromus pyri.	
2.2.	NINROD 25 EC	UPI-320-2003-01/256	buipirmat 250 g/l	Malina (na otvorenom)	Pepehica (Phodospilarea aphans)	-	14	1,4 l/ha	-	8	Spz Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica i štrikva za lice ili nosača koje dobro prijanjaju kod pripreme škropiva i rukovanje koncentratnim sredstvom.	20 m do vodene površine.	Ne preporučuje se mješati s fungicidima iz skupine diklobenilamata (markozab, propineb, metiram), baktericim fungicidima (fosetilm, progamokarbom, svim lužalnim sredstvima i/odionim. Ne smiju se dodavati okvašivači. SP1 Sprejati onečišćenje voda sredstvom ili njegovom amulažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejati onečišćenje odvodnih kanala s podrprivećih gospodarstava i/cesta.	Primjeniti preventivno ili osjetljivih kultura pokazale se najučinkovitom u sprječavanju zaraze na plodovima. Sredstvo je štetno za populacije Erichasia formosai i Tiphodromus pyri.	
2.2.	NINROD 25 EC	UPI-320-2003-01/256	buipirmat 250 g/l	Ogrozd (na otvorenom)	Pepehica (Sphaerotheca mors-uae)	5	14	1,4 l/ha	-	14	Spz Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica i štrikva za lice ili nosača koje dobro prijanjaju kod pripreme škropiva i rukovanje koncentratnim sredstvom.	20 m do vodene površine.	Ne preporučuje se mješati s fungicidima iz skupine diklobenilamata (markozab, propineb, metiram), baktericim fungicidima (fosetilm, progamokarbom, svim lužalnim sredstvima i/odionim. Ne smiju se dodavati okvašivači. SP1 Sprejati onečišćenje voda sredstvom ili njegovom amulažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejati onečišćenje odvodnih kanala s podrprivećih gospodarstava i/cesta.	Primjeniti preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolesti. Sredstvo je štetno za populacije Erichasia formosai i Tiphodromus pyri.	
2.2.	NINROD 25 EC	UPI-320-2003-01/256	buipirmat 250 g/l	Ogrozd (na otvorenom)	Pepehica (Sphaerotheca mors-uae)	6	10	1,1 l/ha	-	14	Spz Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica i štrikva za lice ili nosača koje dobro prijanjaju kod pripreme škropiva i rukovanje koncentratnim sredstvom.	20 m do vodene površine.	Ne preporučuje se mješati s fungicidima iz skupine diklobenilamata (markozab, propineb, metiram), baktericim fungicidima (fosetilm, progamokarbom, svim lužalnim sredstvima i/odionim. Ne smiju se dodavati okvašivači. SP1 Sprejati onečišćenje voda sredstvom ili njegovom amulažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejati onečišćenje odvodnih kanala s podrprivećih gospodarstava i/cesta.	Primjeniti preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolesti. Sredstvo je štetno za populacije Erichasia formosai i Tiphodromus pyri.	

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okolis (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
2.2.	NIREOD 25 EC	UPI-320-2006-01/256	buflinprof 250 g/l	Ogruzd (na otvorenim)	Peperutica (Spodoptera brassicae)	10	7	0,7 l/ha	-	14	Sve Obovezno je nošenje zaštitne odjeće i rukavica, štitnika za lice ili naočala koje dobro pripranja i kod pripreme škropiva rukovanja koncentratnim sredstvom.	20 m do vodene površine.	Ne nepovratnije se mijesati s fungicidima (azoksiprol, mefiram) baktericidnim fungicidima (fosetilom, propikonazolom, svim lužalnim sredstvima rizičnim). Ne smiju se dodavati okvasivači.	Primjeniti sredstvo od početka do kraja vegetacije. Sredstvo je štetno za zlatne žuče, Erichiasa bromasi i Typhlodromus pini.	
2.3.	SHAKAL 500 SC	UPI-320-2006-01/195	fluziaznam 500 g/l	Kupina	Cvrenilo korjena (Phytophthora fragariae var. rubi)	-	-	max. 1,5 l/ha	1250	OVP	20 m do vodene površine.	SPI Sprejčiči onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalazom. Uredaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejčiči onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. Sredstvo se ne smije koristiti na košim erozivnim površinama.	Sredstvo se može primijeniti sve do kraja obzuka u godini berbe.	Ne primjeniti više od 3 l/ha godišnje. Mora se tretirati područje izdanka.	
2.3.	SHAKAL 500 SC	UPI-320-2006-01/195	fluziaznam 500 g/l	Malina	Cvrenilo korjena (Phytophthora fragariae var. rubi)	-	-	max. 1,5 l/ha	1250	OVP	20 m do vodene površine.	SPI Sprejčiči onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalazom. Uredaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejčiči onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. Sredstvo se ne smije koristiti na košim erozivnim površinama.	Sredstvo se može primijeniti sve do kraja obzuka u godini berbe.	Ne primjeniti više od 3 l/ha godišnje. Mora se tretirati područje izdanka.	
2.3.	SHAKAL 500 SC	UPI-320-2006-01/195	fluziaznam 500 g/l	Rubus hibridi	Cvrenilo korjena (Phytophthora fragariae var. rubi)	-	-	Maksimalno 1,5 l/ha	1250	OVP	20 m do vodene površine.	SPI Sprejčiči onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalazom. Uredaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejčiči onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. Sredstvo se ne smije koristiti na košim erozivnim površinama.	Sredstvo se može primijeniti sve do kraja obzuka u godini berbe.	Ne primjeniti više od 3 l/ha godišnje. Mora se tretirati područje izdanka.	



Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okoliš (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
3.2.	PRINEX 48 EC	UPI-320-2097-01/151	<i>Kavirifos</i> 480 g/l	Malina	Lesni uš (Aphididae) Malina pazik (Bursus teneosus) Malina mušica (Resseleia theolator)	3	-	1 l/ha	500-1000	7	SPo. Obavezno je nošenje štira za lica i naočala koje dobro prijanjaju kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPo. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca u odjuru površinsima onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najmanje 14 dana. SPi. Sprejati onečišćenje voda sredstvom ili njegovom amalakom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejati onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava. SPo. Obavezno je nošenje dugo oprskivača ne tretirat usjev za vrijeme otkrija. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjenjivati u periodu otkrija kulture ili korova.	
3.2.	PRINEX 48 EC	UPI-320-2097-01/151	<i>Kavirifos</i> 480 g/l	Malina	Oveni vočni pazik (Panorpius umi)	2	-	1,5 l/ha	500-1000	7	SPo. Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, rukavaca štira za lica i naočala koje dobro prijanjaju kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPo. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca u odjuru površinsima onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najmanje 14 dana. SPi. Sprejati onečišćenje voda sredstvom ili njegovom amalakom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejati onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava. SPo. Obavezno je nošenje dugo oprskivača ne tretirat usjev za vrijeme otkrija. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjenjivati u periodu otkrija kulture ili korova.	
3.2.	PRINEX 48 EC	UPI-320-2097-01/151	<i>Kavirifos</i> 480 g/l	Crni ribiz	Lesni uš (Aphididae) suspenzija lesne sjenice	3	-	1 l/ha	1000	14	SPo. Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, rukavaca štira za lica i naočala koje dobro prijanjaju kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPo. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca u odjuru površinsima onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najmanje 14 dana. SPi. Sprejati onečišćenje voda sredstvom ili njegovom amalakom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejati onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava. SPo. Obavezno je nošenje dugo oprskivača ne tretirat usjev za vrijeme otkrija. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjenjivati u periodu otkrija kulture ili korova.	
3.2.	PRINEX 48 EC	UPI-320-2097-01/151	<i>Kavirifos</i> 480 g/l	Crni ribiz	Oveni pazik	2	-	1,5 l/ha	2000	14	SPo. Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, rukavaca štira za lica i naočala koje dobro prijanjaju kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPo. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca u odjuru površinsima onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najmanje 14 dana. SPi. Sprejati onečišćenje voda sredstvom ili njegovom amalakom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejati onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava. SPo. Obavezno je nošenje dugo oprskivača ne tretirat usjev za vrijeme otkrija. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjenjivati u periodu otkrija kulture ili korova.	
3.2.	PRINEX 48 EC	UPI-320-2097-01/151	<i>Kavirifos</i> 480 g/l	Ograzdi	Lesni uš (Aphididae) suspenzija lesne sjenice	1	-	1 l/ha	1000	14	SPo. Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, rukavaca štira za lica i naočala koje dobro prijanjaju kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPo. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca u odjuru površinsima onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najmanje 14 dana. SPi. Sprejati onečišćenje voda sredstvom ili njegovom amalakom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Sprejati onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava. SPo. Obavezno je nošenje dugo oprskivača ne tretirat usjev za vrijeme otkrija. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjenjivati u periodu otkrija kulture ili korova.	



Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uvele primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okolis (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druge ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
3.2.	PYRINEX 48 EC	LPI/320-2097-01/151	<i>Kapavits</i> 480 g/l	Ograzi	Čveni rak	1	-	1,5 l/ha	2000	14	SP: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, rukavica i rukovanja. Uredaje za primjenu napada dobro pripremiti kod pripreme nerazrijeđenim sredstvom. SP: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica u dodiru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najmanje 14 dana. SP: Sprejki onečišćenje voda sredstvom ili lojnjom na početku napada. Uredaje za primjenu napada ne čisti u blzini površinskih voda. Sprejki onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava tlesia. SP: Opasno za pčele. Rad zaštitne pčela i drugih opravišaća ne tretirati usjev za vrijeme otiarne. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjenjivati u periodu otiarne kulture ili korova.	
3.2.	PYRINEX 48 EC	LPI/320-2097-01/151	<i>Kapavits</i> 480 g/l	Kneski kupus	Lišne uš	2	-	1 l/ha	min. 500	21	SP: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, rukavica i rukovanja. Uredaje za primjenu napada dobro pripremiti kod pripreme nerazrijeđenim sredstvom. SP: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica u dodiru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najmanje 14 dana. SP: Sprejki onečišćenje voda sredstvom ili lojnjom na početku napada. Uredaje za primjenu napada ne čisti u blzini površinskih voda. Sprejki onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava tlesia. SP: Opasno za pčele. Rad zaštitne pčela i drugih opravišaća ne tretirati usjev za vrijeme otiarne. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjenjivati u periodu otiarne kulture ili korova.	
3.2.	PYRINEX 48 EC	LPI/320-2097-01/151	<i>Kapavits</i> 480 g/l	Č. jelača	Lišne uš	2	-	1 l/ha	min. 500	21	SP: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, rukavica i rukovanja. Uredaje za primjenu napada dobro pripremiti kod pripreme nerazrijeđenim sredstvom. SP: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica u dodiru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najmanje 14 dana. SP: Sprejki onečišćenje voda sredstvom ili lojnjom na početku napada. Uredaje za primjenu napada ne čisti u blzini površinskih voda. Sprejki onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava tlesia. SP: Opasno za pčele. Rad zaštitne pčela i drugih opravišaća ne tretirati usjev za vrijeme otiarne. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjenjivati u periodu otiarne kulture ili korova.	
3.2.	PYRINEX 48 EC	LPI/320-2097-01/151	<i>Kapavits</i> 480 g/l	Brokula	Lišne uš	2	-	1,5 l/ha	min. 500	21	SP: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, rukavica i rukovanja. Uredaje za primjenu napada dobro pripremiti kod pripreme nerazrijeđenim sredstvom. SP: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica u dodiru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najmanje 14 dana. SP: Sprejki onečišćenje voda sredstvom ili lojnjom na početku napada. Uredaje za primjenu napada ne čisti u blzini površinskih voda. Sprejki onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava tlesia. SP: Opasno za pčele. Rad zaštitne pčela i drugih opravišaća ne tretirati usjev za vrijeme otiarne. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjenjivati u periodu otiarne kulture ili korova.	
3.2.	PYRINEX 48 EC	LPI/320-2097-01/151	<i>Kapavits</i> 480 g/l	Kneski kupus	Gušavice	2	-	1,5 l/ha	min. 500	21	SP: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, rukavica i rukovanja. Uredaje za primjenu napada dobro pripremiti kod pripreme nerazrijeđenim sredstvom. SP: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica u dodiru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najmanje 14 dana. SP: Sprejki onečišćenje voda sredstvom ili lojnjom na početku napada. Uredaje za primjenu napada ne čisti u blzini površinskih voda. Sprejki onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava tlesia. SP: Opasno za pčele. Rad zaštitne pčela i drugih opravišaća ne tretirati usjev za vrijeme otiarne. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjenjivati u periodu otiarne kulture ili korova.	

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uljevi primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okoliš (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
3.2.	PRINEX 48 EC	UPI-320-2097-01/151	<i>Kararifos</i> 480 g/l	Cyetača	Gljivice	2	-	1,5 l/ha	min. 500	21	SPo. Obavezno je nošenje štira za lica i naočala koje dobro prijaču kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPo. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca u odobru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najranije 14 dana. SP1. Sprejeti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Napada potporučivim gospodstvom. SPo. Obavezno je nošenje dugo opravača ne tretira usjev za vrijeme otkrija. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjeniti u periodu otkrija kulture ili korova.	
3.2.	PRINEX 48 EC	UPI-320-2097-01/151	<i>Kararifos</i> 480 g/l	Brokula	Gljivice	2	-	1,5 l/ha	min. 500	21	SPo. Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, rukavaca štira za lica i naočala koje dobro prijaču kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPo. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca u odobru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najranije 14 dana. SP1. Sprejeti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Napada potporučivim gospodstvom. SPo. Obavezno je nošenje dugo opravača ne tretira usjev za vrijeme otkrija. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjeniti u periodu otkrija kulture ili korova.	
3.2.	PRINEX 48 EC	UPI-320-2097-01/151	<i>Kararifos</i> 480 g/l	Kineski kupus	Svoje pozemlje	2	-	2 l/ha	min. 500	21	SPo. Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, rukavaca štira za lica i naočala koje dobro prijaču kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPo. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca u odobru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najranije 14 dana. SP1. Sprejeti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Napada potporučivim gospodstvom. SPo. Obavezno je nošenje dugo opravača ne tretira usjev za vrijeme otkrija. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjeniti u periodu otkrija kulture ili korova.	
3.2.	PRINEX 48 EC	UPI-320-2097-01/151	<i>Kararifos</i> 480 g/l	Cyetača	Svoje pozemlje	2	-	2 l/ha	min. 500	21	SPo. Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, rukavaca štira za lica i naočala koje dobro prijaču kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPo. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca u odobru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najranije 14 dana. SP1. Sprejeti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Napada potporučivim gospodstvom. SPo. Obavezno je nošenje dugo opravača ne tretira usjev za vrijeme otkrija. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjeniti u periodu otkrija kulture ili korova.	
3.2.	PRINEX 48 EC	UPI-320-2097-01/151	<i>Kararifos</i> 480 g/l	Brokula	Svoje pozemlje	2	-	2 l/ha	min. 500	21	SPo. Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, rukavaca štira za lica i naočala koje dobro prijaču kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPo. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavaca u odobru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najranije 14 dana. SP1. Sprejeti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čisti u blizini površinskih voda. Napada potporučivim gospodstvom. SPo. Obavezno je nošenje dugo opravača ne tretira usjev za vrijeme otkrija. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjeniti u periodu otkrija kulture ili korova.	

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja /ili/ uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okolis (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druge ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
3.2	PYRINEX 48 EC	UPI-320-2097-01/151	<i>Klorpirifos</i> 480 g/l	Kraski kupus	Kupusna muha	1	-	0,1 l/ha (0,1/1000 vode)	-	OVP	SPV. Obavezno je nošenje zaštitne odeće, rukavica i štitnika za lice ili nadzela koje dobro pripremlju kod pripreme nerazrijeđenim sredstvom. SPV. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica u odjuru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najmanje 14 dana. SPV. Sprječati onečišćenje voda sredstvom ili sredstava ne čistih u blizini površinskih voda. Sprječati onečišćenje vodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i ostala. SPV. Opasno za pčele. Rad zaštitne pčela i drugih opraskivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo se primjenjuje u razmaku od 14 dana na način da se zalije baza (korjenov vrst) svele biljke sa približno 70 ml škropiva ili 5 L škropiva na 30 m dugi rad. Sredstvo se može primijeniti presadivajući do 4. dana nakon presadivanja.	Sredstvo je opasno za pčele.
3.2	PYRINEX 48 EC	UPI-320-2097-01/151	<i>Klorpirifos</i> 480 g/l	Cvjetača	Kupusna muha	1	-	0,1 l/ha (0,1/1000 vode)	-	OVP	SPV. Obavezno je nošenje zaštitne odeće, rukavica i štitnika za lice ili nadzela koje dobro pripremlju kod pripreme škropive i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPV. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica u odjuru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najmanje 14 dana. SPV. Sprječati onečišćenje voda sredstvom ili sredstava ne čistih u blizini površinskih voda. Sprječati onečišćenje vodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i ostala. SPV. Opasno za pčele. Rad zaštitne pčela i drugih opraskivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo se primjenjuje na način da se zalije baza (korjenov vrst) svele biljke sa približno 70 ml škropiva ili 5 L škropiva na 30 m dugi rad. Sredstvo se može primijeniti presadivajući do 4. dana nakon presadivanja.	Sredstvo je opasno za pčele.
3.2	PYRINEX 48 EC	UPI-320-2097-01/151	<i>Klorpirifos</i> 480 g/l	Brokula	Kupusna muha	1	-	0,1 l/ha (0,1/1000 vode)	-	OVP	SPV. Obavezno je nošenje zaštitne odeće, rukavica i štitnika za lice ili nadzela koje dobro pripremlju kod pripreme škropive i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPV. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica u odjuru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najmanje 14 dana. SPV. Sprječati onečišćenje voda sredstvom ili sredstava ne čistih u blizini površinskih voda. Sprječati onečišćenje vodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i ostala. SPV. Opasno za pčele. Rad zaštitne pčela i drugih opraskivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo se primjenjuje na način da se zalije baza (korjenov vrst) svele biljke sa približno 70 ml škropiva ili 5 L škropiva na 30 m dugi rad. Sredstvo se može primijeniti presadivajući do 4. dana nakon presadivanja.	Sredstvo je opasno za pčele.
3.2	PYRINEX 48 EC	UPI-320-2097-01/151	<i>Klorpirifos</i> 480 g/l	Luk	Svoje pozemlište	1	-	2 l/ha	min-500	21	SPV. Obavezno je nošenje zaštitne odeće, rukavica i štitnika za lice ili nadzela koje dobro pripremlju kod pripreme škropive i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPV. Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica u odjuru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine najmanje 14 dana. SPV. Sprječati onečišćenje voda sredstvom ili sredstava ne čistih u blizini površinskih voda. Sprječati onečišćenje vodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i ostala. SPV. Opasno za pčele. Rad zaštitne pčela i drugih opraskivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo se primjenjuje na način da se zalije baza (korjenov vrst) svele biljke sa približno 70 ml škropiva ili 5 L škropiva na 30 m dugi rad. Sredstvo se može primijeniti presadivajući do 4. dana nakon presadivanja.	Sredstvo je opasno za pčele. Sredstvo se ne smije primjenjivati parno u cvatnje kulture i korova.

Redni broj	Naziv sredstva	Klasa rešenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maksimalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Ograničenja za primjenitelja	Ograničenja - okoliš (sigurnosni razmak od površinske vode)	Druga ograničenja	Vrijeme primjene	Napomena
3.2	PRINEX 48 EC	UPI-320-2093-01151	Klifenpirifos 480 g/l	Poljnik	Trips	2	-	1,5 l/ha	200-600	21	SFC Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme i rukovanja. SFC Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica u dodiru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m do vodene površine.	Domaćini životinja zabranjeni je ulaziti u područje naprave - 14 dana. SFC Sprječati onečišćenje voda sredstvom ili škropivom nakon primjene. SFC Sprječati onečišćenje vodnih kanala s pomoću vodnih gospodarskih ostataka. SFC Obavezno zaštitne ruke. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje voća. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.	Sredstvo se primjenjuje na površinu prije primjene u periodu od 14 dana od početka napada štetnika.	Sredstvo je registrirano za primjenu na male kulture ili korova.
4.1.	APOLLO 50 SC	UPI-320-2093-01164	Klifenpirifos 500 g/l	Kupina	Grinje	3	-	0,4 l/ha	1000	14	SFC Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme i rukovanja. SFC Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica u dodiru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m	-	Primjeniti sredstva posebjno je na maloj površini napravit test.	Primjeniti sredstva posebjno je na maloj površini napravit test.
4.1.	APOLLO 50 SC	UPI-320-2093-01164	Klifenpirifos 500 g/l	Malina	Grinje	3	-	0,4 l/ha	1000	14	SFC Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme i rukovanja. SFC Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica u dodiru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m	-	Primjeniti sredstva posebjno je na maloj površini napravit test.	Primjeniti sredstva posebjno je na maloj površini napravit test.
4.1.	APOLLO 50 SC	UPI-320-2093-01164	Klifenpirifos 500 g/l	Ribiz	Grinje	3	-	0,4 l/ha	1000	14	SFC Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme i rukovanja. SFC Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica u dodiru s površinama onečišćenim koncentriranim sredstvom ili škropivom.	20 m	-	Primjeniti sredstva posebjno je na maloj površini napravit test.	Primjeniti sredstva posebjno je na maloj površini napravit test.